

Ganglion Gasseri blokkade ('Sweet-procedure')

Inleiding


In deze folder leest u informatie over een ganglion Gasseri blokkade. Uw pijnspecialist heeft de behandeling al met u besproken.

Ganglion Gasseri blokkade ('Sweet-procedure')

Door de ganglion Gasseri blokkade kan de aangezichtspijn verminderen.

Een ganglion is een zenuwknoop waar een aantal zenuwbanen samenkomen die belangrijk zijn voor de pijn in een bepaald gebied van het lichaam. Het ganglion van Gasseri is een grote zenuwknoop die zich in het gezicht bevindt, aan de schedelbasis. Door deze zenuwknoop lopen de zenuwvezels die te maken hebben met een bepaalde vorm van aangezichtspijn, ook wel 'trigeminus neuralgie' genoemd. Door een blokkade van dit ganglion kunnen bepaalde vormen van trigeminus neuralgie worden behandeld. Hierbij wordt het ganglion Gasseri voor een deel uitgeschakeld met een elektrische stroombehandeling.

Het ganglion wordt hierdoor verwarmd en de zenuwgeleiding onderbroken, zodat deze geen pijnsignalen meer door kan geven.



Vorbereiding

Als u medicijnen voor antistolling gebruikt, zal de pijnspecialist met u bespreken of/en wanneer u met deze medicatie moet stoppen en wanneer u na de behandeling weer kunt starten. Voor de dag waarop de behandeling plaatsvindt, maken we met u een afspraak om uw bloedstolling te controleren.

De behandeling vindt plaats onder sedatie. Dit is een lichte slaap die het bewustzijn en de pijn vermindert, waardoor u minder ongemak ervaart van de behandeling. Na de behandeling slaapt u uit op de uitslaapkamer.

Vorbereiding op de sedatieprocedure

Voor volwassenen geldt:

- Tot 6 uur voor het tijdstip dat u zich in het ziekenhuis moet melden, mag u nog eten of drinken.
- Vanaf 6 uur tot 2 uur voor het tijdstip dat u zich in het ziekenhuis moet melden, mag u alléén nog de volgende dranken drinken: water, thee, appelsap of aanmaaklimonade (heldere vloeistof zonder prik/koolzuur).
- Tot aan het moment van de ingreep, mag u wel een slokje water drinken.



Waarom mag u voor een onderzoek/ behandeling niet eten of drinken?

De maag moet leeg zijn. Een lege maag voorkomt dat de inhoud van de maag in de longen terecht komt. Dit kan ernstige gevolgen hebben voor uw gezondheid. Door nuchter te blijven, kunnen ernstige complicaties worden voorkomen.

Uw pijnspecialist kan eventueel andere afspraken met u maken als u een ingreep ondergaat waarvoor u om bepaalde redenen langer nuchter moet zijn.

De dag van behandeling

Op de dag van de behandeling komt u nuchter naar het ziekenhuis. U mag wel uw eigen medicatie met water innemen, tenzij anders door de pijnspecialist is aangegeven.

Wilt u zich op de afgesproken tijd melden bij de receptie, bij de hoofdingang van het Groene Hart Ziekenhuis (GHZ)? U wordt begeleid naar de Dagbehandeling (D2-route 37), waar u tijdelijk wordt opgenomen. Van daaruit begeleidt een pijnconsulent u naar de behandelkamer, waar de behandeling plaatsvindt. Als u bloed moet laten prikken voor de opname op de dagbehandeling, dan kunt u dit doen bij de Bloedafname (route 27).

De behandeling

De behandeling vindt plaats op de behandelkamer. De pijnconsulent zal de bewakingsapparatuur aansluiten en u krijgt een infuusnaaldje in uw hand of arm. U krijgt zuurstof toegediend via een slangetje in de neus.

Tijdens de behandeling ligt u op uw rug. De pijnspecialist plaatst een speciale naald ter hoogte van uw wang. Met behulp van röntgenbeelden wordt de naald in de goede positie gebracht: aan de rand van de schedel, onder het jukbeen door. Als de naald is ingebracht, wordt u kort wakker gemaakt om te controleren of de naald op de juiste plek zit. Dit gebeurt door middel van kleine elektrische stroompjes.

Als u een lichte tinteling voelt in het aangedane deel van uw gezicht, zit de

naald op de juiste plaats. Daarna wordt u weer in slaap gebracht.

Vervolgens geeft de pijnspecialist een elektrische stroombehandeling via de naald bij het ganglion om deze (tijdelijk) te blokkeren. Hierdoor ontstaat er minder pijn. De behandeling duurt ongeveer één uur.

Na de behandeling

Als de behandeling klaar is, wordt de sedatie stopgezet. U wordt snel weer wakker op de uitslaapkamer, waar een verpleegkundige u in de gaten houdt. Na de sedatie mag u direct weer gaan drinken en eten. De behandeling kan in dagopname plaatsvinden. Als het nodig is kan afgesproken worden om één nacht in het ziekenhuis te blijven ter observatie.

Het resultaat van de behandeling is na een aantal weken het beste te beoordelen. Het is goed mogelijk dat u al eerder een gunstig effect op de pijnklachten bemerkt.

Complicaties

Er bestaat een kleine kans op het optreden van complicaties door de ganglion Gasseri blokkade:

- Er kan een blauwe plek ontstaan op de plaats waar geprikt is.
- Na de behandeling kan er napijn optreden. Deze napijn kan enkele weken aanhouden, maar verdwijnt weer vanzelf. Voor de napijn kunt u pijnmedicatie innemen.
- U kunt koorts krijgen.
- U kunt een allergische reactie krijgen op de gebruikte medicatie.
- Minder vaak voorkomende complicaties zijn een doof gevoel in het gezicht en het hoornvlies of krachtsverlies in de kauwspier.
- Een zeer zeldzame complicatie is de ontwikkeling van zenuwpijn in het behandelde gebied (anesthesia dolorosa).
- Soms kan misselijkheid optreden als bijwerking van de verschillende geneesmiddelen tijdens de sedatie. We proberen dit zo veel mogelijk te voorkomen.

- In de loop van de uren na de behandeling kunt u zich nog slaperig voelen.

In geval van koorts, nekstijfheid of een allergische reactie, moet u **direct contact opnemen** met pijnconsulent/ pijnspecialist.

Belangrijk

- Verwijder nagellak en make-up. Het is belangrijk dat de pijnspecialist de natuurlijke kleur van uw huid en nagels kan zien.
- Laat waardevolle spullen thuis.

U mag na de behandeling niet alleen naar huis en u mag geen voertuig besturen.

Alleen met het openbaar vervoer reizen raden wij af.

Wij adviseren u ervoor te zorgen dat er de eerste 24 uur na de behandeling iemand in uw buurt is.

Contact opnemen

Neem contact met ons op als u:

- (mogelijk) zwanger bent;
- diabetes heeft;
- overgevoelig of allergisch bent;
- niet weet of u met de bloedverdunners moet stoppen of niet;
- koorts heeft op de dag van de behandeling.

Controleafspraak

Na twee weken krijgt u een telefonische controleafspraak. Het afsprakenkaartje krijgt u direct na de behandeling mee.

Vragen?

Heeft u na het lezen van deze folder vragen over de pijnbehandeling? Stel deze vragen gerust aan de pijnspecialist of de pijnconsulent.

Spreekuur pijnconsulenten

De pijnconsulenten hebben op werkdagen van maandag tot vrijdag van 9.00 tot 10.00 uur een telefonisch spreekuur. Zij zijn te bereiken via telefoonnummer (0182) 50 51 06. U kunt altijd bellen voor vragen en advies.

Maken en wijzigen van afspraken

Voor het maken van afspraken (en eventueel het wijzigen daarvan) kunt u op werkdagen bellen met het secretariaat van de pijnpoli (0182) 50 50 07 tussen 8.00 en 16.00 uur.

Meer informatie

Voor informatie over het ziekenhuis kunt u terecht op onze internetsite: www.ghz.nl.

Adres

Groene Hart Ziekenhuis, locatie Gouda
Bleulandweg 10
2803HH Gouda

Contact

Algemene telefoonnummer ziekenhuis:
(0182) 50 50 50

Colofon

uitgave: Groene Hart Ziekenhuis, Gouda
productie: Marketing & Communicatie
januari 2025
04.01.055