

Hypogastricus blokkade

Inleiding

Deze folder geeft u informatie over een *hypogastricus blokkade*. Uw arts heeft deze behandeling al met u besproken.

Plexus hypogastricus blokkade

Een hypogastricus blokkade is een blokkade van een netwerk van zenuwen in de onderbuik. Dit zenuwnetwerk wordt plexus hypogastricus genoemd. Het aanbrengen van een blokkade op die plaats, kan worden toegepast bij ernstige pijnklachten als gevolg van pijn in de onderbuikorganen, zoals:

A: Pijn met een gynaecologische oorzaak:

De pijnklachten kunnen wel of niet afhankelijk zijn van de menstruele cyclus. De meest voorkomende oorzaken van pijnklachten zijn endometriose, adhesies (verklevingen) en chronische ontsteking.

B: Pijn door niet-gynaecologische oorzaken:

Hieronder vallen o.a.: blaasontsteking, spastisch colon en pijn na een operatie of bestraling.

C: Pijn door maligniteiten (kwaadaardig weefsel) vanuit de bekkenorganen:

Hieronder vallen o.a. prostaatcarcinoom, kwaadaardige tumoren van de baarmoeder, eileiders of de blaas.

Doel van de behandeling

Bij deze behandeling is het doel om ernstige pijn in de onderbuik te verminderen.

Vorbereiding

Als u medicijnen voor antistolling gebruikt zal de narcose-arts (anesthesioloog) met u bespreken of/en wanneer u met deze medicatie moet stoppen. En wanneer u na de behandeling weer kunt starten. Voor de dag van behandeling maken we met u een afspraak om uw bloedstolling te controleren.

De behandeling vindt plaats onder plaatselijke verdoving.

Het kan nodig zijn om de behandeling onder algehele narcose uit te voeren. In dat geval moet u 6 uur voor de afspraak nuchter zijn (dit betekent dat u niets meer mag eten en drinken). Hiervoor krijgt u een aparte informatiefolder mee.

De dag van behandeling

Op de dag van behandeling kunt u gewoon eten /drinken en uw andere medicatie innemen, tenzij u algehele narcose krijgt (zie hierboven).

Op de afgesproken tijd meldt u zich bij de receptie bij de hoofdingang van het ziekenhuis. U wordt begeleid naar het Dagbehandelcentrum (D2 -route 37) waar u tijdelijk wordt opgenomen. Van daaruit begeleidt een verpleegkundige u naar de behandelkamer, waar de behandeling plaatsvindt.

Als is afgesproken dat u bloed moet laten prikken voor de behandeling dan kunt u dat doen voor u naar het Dagbehandelcentrum gaat. Dit kan bij de bloedafname (route 27).

De behandeling

De behandeling vindt plaats op de behandelkamer.

Als dat zo is afgesproken wordt u eerst onder narcose gebracht, anders krijgt u plaatselijke verdoving.

Tijdens de behandeling ligt u op uw buik. Bij de behandeling gaat een naald via een prik in de rug richting de wervelkolom tot de voorzijde van de wervelkolom wordt bereikt. Aan de linker zijde en aan de rechterzijde van de wervelkolom. Dit wordt gecontroleerd door middel van röntgendoorlichting en contrastmiddel.

Als de juiste plaats is bereikt wordt de medicatie ingespoten.

Op de prikplaats wordt een pleister geplakt die thuis verwijderd kan worden. De behandeling duurt ongeveer 30 tot 60 minuten. Na de behandeling gaat u gedurende ongeveer 30 minuten naar de recovery om de bloeddruk en zuurstofgehalte te controleren.

De behandeling kan als dagopname plaatsvinden. Dat betekent dat u in principe dezelfde dag weer naar huis mag. Als het nodig is kan afgesproken worden om één nacht in het ziekenhuis te blijven ter observatie.

Complicaties

Er bestaat een kleine kans op het optreden van complicaties.

Aandachtspunten zijn:

- Incontinentie voor urine en ontlasting.
- Spierzwakte in de benen.
- Verlies van gevoel of juist overgevoeligheid van de onderste ledematen en/of het zitvlak.
- Impotentie.

Belangrijk: als u voor deze behandeling naar het ziekenhuis komt, is het noodzakelijk dat u vervoer naar huis regelt.

Na de behandeling mag u 24 uur niet aan het verkeer deelnemen.

Resultaat

- Na de behandeling kan er napijn optreden die enkele weken duurt en vanzelf verdwijnt.
- Het beste resultaat van de behandeling is te beoordelen na een dag.

Controleafspraak

Na een aantal weken krijgt u een controleafspraak. De controleafspraak wordt direct na de behandeling aan u meegegeven.

Algemene informatie over het GHZ

Voor informatie over het ziekenhuis kunt u terecht op onze internetsite: www.ghz.nl. Ook kunt u bellen naar het algemene informatienummer (0182) 50 50 50

Vragen?

In deze folder hebben we een en ander verteld over een hypogastricusblokkade. Heeft u na het lezen van deze folder vragen over de pijnbehandeling, stelt u die dan gerust aan de arts of pijnverpleegkundige.

Spreekuur pijnverpleegkundigen

De pijnverpleegkundigen hebben een telefonisch spreekuur op werkdagen van maandag tot vrijdag van 9.00 tot 10.00 uur. Zij zijn te bereiken via telefoonnummer (0182) 50 51 06. U kunt altijd bellen voor vragen en advies.

Afspraken

Voor afspraken kunt u bellen met het secretariaat van de pijnpoli (0182) 50 50 07 tussen 8.00 en 12.00 uur en tussen 13.00 en 16.00 uur.

Colofon

uitgave : Groene Hart Ziekenhuis, Gouda
productie : Marketing & Communicatie
februari 2018
04.01.042