


Scleroseren van Morel-Lavallée laesie

Inleiding

U bent zojuist op de Poli Chirurgie geweest waar u met de dokter heeft afgesproken om de Morel Lavallée laesie te laten scleroseren. **Scleroseren** is een manier om een holte te laten verkleven/ samenvallen met een injectie (in dit geval met doxycycline). Deze holte is gevuld met vocht en is ontstaan na een trauma.



U heeft een recept mee gekregen voor 1 tablet van 100mg doxycycline. Dit is om te testen op eventuele overgevoeligheid. De tablet neemt u op zeer korte termijn in. U krijgt een telefonisch consult enkele dagen later om navraag te doen naar bijwerkingen en/of allergieën.

Opmerking vooraf

Graag horen wij voordat de behandeling plaatsvindt van u:

- Of u besmet bent met MRSA of een andere resistente bacterie;
- Of u afgelopen jaar in een buitenlands ziekenhuis opgenomen bent geweest.

Neem in bovenstaande gevallen contact op met uw behandelend specialist of met de afdeling Radiologie, zodat wij hiermee zoveel mogelijk rekening kunnen houden.

Doel van de procedure

Het scleroseren van een Morel Lavallée laesie.

Vorbereiding

Opname

Voor deze behandeling is het noodzakelijk dat u voor één dag wordt opgenomen in het ziekenhuis. Op de dag van opname meldt u zich bij de balie in de centrale hal waarna u naar de afdeling wordt gebracht.

Eten en drinken

- Voor deze behandeling hoeft u niet nuchter te zijn.

Medicatie

- U kunt uw medicijnen op de dag van de opname gewoon innemen, tenzij uw behandelend arts anders beslist.
- Als u bloedverdünnende medicatie gebruikt, zal uw behandelend arts met u bespreken of u deze medicatie kunt blijven gebruiken of dat deze tijdelijk vervangen moet worden door andere medicatie.

Advies behandelend arts:

Bij staken:

Tijdelijke vervanging:

Verdere voorbereidingen

- Neem makkelijk zittende kleding mee.
- Laat waardevolle spullen thuis.

De behandeling

Als de interventiekamer heeft gebeld gaat u in bed naar de afdeling Radiologie.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een interventieradioloog met 1 of 2 interventielaboranten.

Bij het eerste bezoek wordt de holte leeg gezogen en wordt de doxycycline ingespoten. Dit duurt ongeveer 30 minuten.

Daarna gaat u weer terug naar de verpleegafdeling en gaat u gedurende 1 uur wisselend op de linker- en de rechterzijde liggen. Zo wordt de vloeistof goed door de holte verspreid. Na 1 uur gaat u opnieuw naar de afdeling Radiologie waar de holte weer wordt leeggezogen.

Na de behandeling

Met een spica-drukverband gaat u weer naar de afdeling. Daar krijgt u een spica-broek welke u 4 weken moet dragen, dag en nacht. U mag deze **alleen af doen voor douchen/wassen**.

Nazorg

Als u alleen bent opgenomen voor deze procedure kunt u in principe dezelfde dag nog naar huis (dagopname) De arts zal dit met u bespreken.

Mogelijke algemene complicaties

Zoals bij iedere ingreep is de kans op complicaties aanwezig. Ze komen niet vaak voor en in de meeste gevallen kunnen ze snel verholpen worden. Uw behandelend arts zal deze met u bespreken.

De volgende complicatie kan voorkomen:

- Hematoom (blauwe plek);
- Een ontsteking van de huid en/of holte.

Vragen?

Wij hopen dat u tevreden zult zijn over uw behandeling op de afdeling Radiologie. Mocht dit niet het geval zijn of heeft u vragen/opmerkingen, aarzel dan niet contact op te nemen met de afdeling Radiologie.

Van maandag tot en met vrijdag, tussen 8.00 en 17.00 uur kan dit via het telefoonnummer: (0182) 50 50 15.

Ook kunt u uw vragen stellen aan de radioloog en/of radiodiagnostisch laborant(e) die bij het onderzoek aanwezig is.

Algemene informatie

Voor algemene informatie over het ziekenhuis of over de afdeling Interventieradiologie kunt u terecht op onze internetsite: www.ghz.nl. U vindt ons onder: interventieradiologie.

Uw afspraak is op:

Dag.....

Datum:.....

Meldtijd:uur

Groene Hart Ziekenhuis, Locatie Gouda

Bleulandweg 10
2803 HH Gouda

Algemeen telefoonnummer ziekenhuis:
(0182) 50 50 50

Colofon

uitgave : Groene Hart Ziekenhuis, Gouda
productie : Marketing & Communicatie
december 2024
05.08.119