

Infuus met Ferinject

U krijgt een infuus met Ferinject. In deze folder leest u meer over dit medicijn en waar u, na de behandeling, thuis op moet letten.

Belangrijke punten

- U krijgt een medicijn tegen bloedarmoede.
- Het medicijn heet Ferinject.
- U krijgt Ferinject via een infuus in uw arm.
- De behandeling duurt 30 tot 60 minuten.
- U krijgt het infuus in het ziekenhuis.
- Na de behandeling mag u naar huis.
- Ferinject kan bijwerkingen hebben.
- Bel bij erge bijwerkingen naar de polikliniek Interne Geneeskunde (via 0182 – 50 50 50) of uw huisarts.
- Heeft u vragen over de behandeling? Vraag het uw arts of de verpleegkundige op de afdeling.

Waarom krijgt u Ferinject?

Ferinject is een medicijn tegen bloedarmoede. Bloedarmoede betekent dat u te weinig rode bloedcellen heeft. Deze cellen zijn belangrijk omdat ze zuurstof door uw lichaam vervoeren.

Ferinject bevat ijzer. Dat is nodig om nieuwe rode bloedcellen te maken. Dit medicijn wordt gebruikt als ijzertabletten niet genoeg helpen of als u die niet kunt slikken.

De behandeling

- U krijgt Ferinject via een infuus in uw arm. Een infuus is een dun slangetje dat met een naald in uw ader wordt gebracht.
- De behandeling duurt 30 tot 60 minuten.
- De behandeling wordt gegeven in het ziekenhuis, op de dagbehandeling Interne Geneeskunde. Zo kunnen we u goed in de gaten houden. U vindt de

dagbehandeling op afdeling B4 (volg route 62);

Na de behandeling

- Na de behandeling mag u naar huis.

Bijwerkingen

Ferinject kan bijwerkingen hebben. Niet iedereen krijgt bijwerkingen.

Drink de dag van de behandeling meer water dan u normaal doet. Dit kan helpen om bijwerkingen te verminderen.

De volgende bijwerkingen komen vaak voor:

- Hoofdpijn;
- Duizelig zijn;
- Misselijk zijn;
- Buikpijn;
- Verstopping;
- Diarree;
- Uitslag;
- Irritatie op de plek van het infuus.

Soms kunt u last krijgen van:

- Jeuk of tintelingen zonder reden (paresthesie);
- Huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes;
- Lage bloeddruk (uw bloeddruk wordt in het ziekenhuis gemeten);
- Een rode huid;
- Smaakverandering;
- Klachten zoals boeren, maagpijn, zuurbranden;
- Rugpijn;
- Spierpijn;
- Gewrichtspijn;
- Koorts;
- Vermoeidheid;
- Pijn in de borstkast;

- Stijfheid;
- Vochtophoping;
- Overgevoeligheid en ernstige allergische reacties;
- Kortademigheid (dit komt zelden voor).

Heeft u klachten die erger worden of die niet in deze folder staan? En heeft u met de internist afgesproken dat u een infuus met Ferinject krijgt? Bel dan naar de polikliniek Interne Geneeskunde via 0182 – 50 50 50 (geef hierbij de naam van uw internist door).

Heeft u met uw huisarts afgesproken dat u een infuus met Ferinject krijgt? Bel dan bij klachten uw huisarts.

Heeft u nog vragen?

Stel ze gerust aan de arts die bij uw behandeling is betrokken of aan de verpleegkundige van de afdeling.

Of bel op werkdagen tussen 8.00 uur en 16.30 uur naar de polikliniek Interne Geneeskunde via 0182- 50 50 50.

Groene Hart Ziekenhuis, Locatie Gouda

Bleulandweg 10
2803 HH Gouda

www.ghz.nl

Colofon

uitgave: Groene Hart Ziekenhuis, Gouda
productie: Marketing & Communicatie
maart 2025
04.07.095