

Medische Beeldvorming Nucleaire Geneeskunde

PATIËNTENINFO

Groene Hart Ziekenhuis 
Open voor iedereen

Schildklierscintigrafie met uptake bepaling van jodium-123

1 en 2: Uw afspraak voor de toediening en soms een scan

Datum:

Tijd: en

3: Uw afspraak voor de scan

Datum:

Tijd:

Volg route 70. Wees op tijd! Zo kunnen we het onderzoek op tijd doen.

Waarom doen we dit onderzoek?

Met dit onderzoek kijken we naar de werking en vorm van uw schildklier. Er wordt berekend hoeveel van het toegediende jodium in uw schildklier terecht komt (uptake bepaling).

Wat moet u doen voordat u naar het ziekenhuis komt?

- U moet medicijnen voor uw schildklier tijdelijk stoppen:
 - carbimazol, thiamazol en strumazol minimaal drie dagen;
 - propylthiouracil (PTU) minimaal vijftien dagen;
 - levothyroxine (Eltroxin®, Euthyrox®, Levothyroxine®, Thyrax®, Thyrofix®, Tirosint®) vier weken;
 - trijodothyroxine (Cytomel®) minimaal drie weken.

- De volgende producten moeten twee weken gestopt worden:
 - jodiumhoudende hoestdranken;
 - multivitaminen;
 - visolie;
 - homeopathische producten (zoals kelp en zeewier);
 - zeepproducten (zoals povidon zeep en shampoo);
 - hennashampoo/kleurmiddel.
- U mag in de drie maanden voor het onderzoek geen CT-scan met contrast gehad hebben;
- Voor het eerste deel van het onderzoek mag u 4 uur vóór de afspraak niets eten of drinken;
- U mag wel af en toe een slokje water nemen;
- Laat uw sieraden thuis.

Tijdens het onderzoek

Het onderzoek bestaat uit 2 of 3 delen:

1. Toediening van de capsule met jodium:
 - U krijgt van de laborant een capsule die u met water inneemt;
 - U mag hierna meteen weer weg;
 - Een half uur later mag u weer eten en drinken.
2. Soms maken we ongeveer drie uur later de eerste scan, als dit voor u nodig is krijgt u hiervoor een tijd mee:
 - Voor de scan drinkt u een beetje water;
 - Hierna maken we een scan van de schildklier;
 - De scan duurt ongeveer 10 minuten;

- Het is belangrijk dat u tijdens de scan goed stil blijft liggen.
3. Ongeveer 24 uur later volgt (nog) een scan van de schildklier:
- Voor de scan drinkt u een beetje water;
 - Hierna maken we een scan van de schildklier;
 - De scan duurt ongeveer 10 minuten;
 - Het is belangrijk dat u tijdens de scan goed stil blijft liggen;
 - Soms maken we hierna nog een langere scan.

Na het onderzoek

Na de scan kunt u weer naar huis.

Ligt u in het ziekenhuis? Dan gaat u terug naar de afdeling.

De uitslag van het onderzoek is niet meteen bekend. Die krijgt u later van uw behandelend arts.

Kunt u niet komen?

Geef dit dan zo snel mogelijk door. De capsule die we bij dit onderzoek gebruiken is kostbaar en speciaal voor u besteld.

Bent u zwanger of geeft u borstvoeding?

Neem dan contact op met de afdeling Medische Beeldvorming. In overleg met de arts kijken we of het onderzoek door kan gaan.

Is de straling gevaarlijk?

Nee, de straling is niet gevaarlijk. De hoeveelheid radioactiviteit die we gebruiken is heel klein. De capsule geeft geen bijwerkingen.

Heeft u nog vragen of opmerkingen?

Bel ons dan gerust. Tijdens het onderzoek kunt u uw vragen stellen aan een medewerker van de afdeling Medische Beeldvorming.

Adres

Groene Hart Ziekenhuis
Afdeling Medische Beeldvorming
Bleulandweg 10, 2803 HH Gouda
Route 70
Telefoon: (0182) 50 50 15

Algemeen telefoonnummer ziekenhuis:
(0182) 50 50 50

Colofon

uitgave : Groene Hart Ziekenhuis, Gouda
productie : Marketing & Communicatie
Januari 2025
05.09.053