

Port-a-Cath (PAC)

Inleiding

Uw arts heeft besloten dat u een behandeling moet ondergaan waarbij een bloedvat continu of met tussenpozen wordt aangeprikt. Er kunnen verschillende redenen zijn waarom een bloedvat in de arm zelf niet veelvuldig aangeprikt kan worden. Een veel voorkomende reden is dat het bloedvat beschadigd raakt.

Daarom wordt er bij u binnenkort een PAC (Port-a-Cath) ingebracht. Een PAC is speciaal ontworpen om bloedafname en het toedienen van medicijnen te vergemakkelijken.

Deze folder geeft informatie over de PAC, de ingreep en de toepassing.

Mocht u na het lezen nog vragen hebben, stelt u deze dan gerust aan uw arts of verpleegkundige.

Wat is een PAC?


Een PAC is een reservoir (port) met daaraan een siliconen slangetje (katheter) wat - meestal op de borst- onder de huid geplaatst wordt. De katheter wordt in de ader opgeschoven tot de punt net boven het hart ligt. Alle onderdelen van de PAC worden volledig onder de huid geplaatst.

Een PAC kan vele jaren meegaan.

De ingreep

Voor de plaatsing wordt er een poliklinische afspraak gemaakt bij de chirurg.


Na het gesprek met deze arts wordt er een afspraak gemaakt voor een dagopname. De operatie is vrij eenvoudig en duurt ongeveer 30 minuten. De PAC wordt op de operatiekamer ingebracht. Dit gebeurt onder narcose. Er worden twee kleine sneetjes in de huid gemaakt om het reservoir en de katheter in te brengen. Het reservoir wordt op onderliggend weefsel vastgehecht. De huid wordt gehecht met zelfoplosbare hechtingen.



Na het inbrengen wordt er nog een controlefoto gemaakt. Hierna kan de PAC in principe direct gebruikt worden.

U ontvangt een implantatiebewijs. Vraag hier zo nodig om.

Aan het inbrengen van een PICC of PAC zijn risico's verbonden. Deze worden door de behandelaar met u besproken.



Port-A-Cath® veneus systeem

Aanprikken en gebruik

Alleen een arts of een daartoe speciaal opgeleide verpleegkundige mogen de PAC aanprikken. Omdat de huid rond het operatiegebied de eerste week nog wat gezwollen en gevoelig kan zijn wordt er meestal even gewacht voor de PAC voor de eerste keer wordt aangeprikt.

In het reservoir van de PAC zit een membraam. Met een speciale naald wordt deze membraam, door de huid, aangeprikt. U zult een kleine prik voelen. De infuusvloeistoffen of medicijnen gaan via de naald in het reservoir en vervolgens door de katheter rechtstreeks het bloedvat in.

Tijdens de toediening wordt de naald met een folie op de huid bevestigd.

Na de toediening wordt de PAC naald verwijderd.

Het kan ook voorkomen dat medicijnen meerdere dagen toegediend moeten worden. In dat geval blijft de naald zitten. Dit kan zowel in het ziekenhuis als thuis. Bij thuisgebruik van de PAC wordt u, desgewenst en zo nodig, ondersteund door het Team Technische Thuiszorg Midden-Holland (TMMH).

Doorspoelen

Het systeem moet na elke behandeling doorgespoeld worden met een Heparineoplossing. Dit wordt een Heparineslot genoemd.

Ter voorkoming van verstopping moet de PAC 1 keer per 4 weken doorgespoeld worden.

Aandachtspunten

- Nadat de PAC is ingebracht en de wond genezen, kunt u al uw gebruikelijke activiteiten weer hervatten.
- U kunt een bad nemen, douchen, zwemmen en deelnemen aan sport als u dat wenst.
- Het is verstandig de aanprikplaats regelmatig te inspecteren.
- Neem bij de volgende waarnemingen contact op met de arts of verpleegkundige: roodheid, zwelling, irritatie, pijn of koorts.
- U kunt met dit systeem zonder problemen door het poortje van de luchthaven en het warehouse.
- PAC is een veel gebruikt systeem over de hele wereld. In vrijwel elk land zijn ziekenhuizen waar artsen ervaring met dit systeem hebben en u kunnen helpen.
- Zorg dat u het implantatiebewijs bij u draagt.
- De PAC kan ook gebruikt worden voor het inbrengen van contrastvloeistof. Bijvoorbeeld bij een CT scan. Hiervoor zijn bij het Behandelcentrum Oncologie Hematologie speciale naalden beschikbaar.

Algemene informatie over het GHZ

Voor algemene informatie over het ziekenhuis kunt u terecht op de website van Het Groene Hart Ziekenhuis: www.ghz.nl.

U kunt ook bellen naar het algemene informatienummer: (0182) 50 50 50.

Heeft u nog vragen?

In deze folder geven wij informatie over de PAC, de ingreep en de toepassing.

Als u nog vragen heeft, stel die dan gerust aan uw arts of verpleegkundige.

Als u vindt dat bepaalde informatie uit deze folder ontbreekt of onduidelijk is, dan horen wij dat graag.

Groene Hart Ziekenhuis, Locatie Gouda

Bleulandweg 10
2803 HH Gouda

Algemeen telefoonnummer ziekenhuis:
(0182) 50 50 50.

Colofon

uitgave : Groene Hart Ziekenhuis, Gouda
productie : Marketing & Communicatie
december 2024
04.07.082